

Vulnerabilidad social e infección por VIH/ITS en hombre cis y mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en Cataluña.

Estudio SexCohort

L Ferrer, C Folch, V González, A Antuori, S Paytubi, M Villar, H Adell, M Cebrián, M Meroño, E Martró, L Alemany, J Casabona y Grupo SexCohort*

* J Casabona C Folch L Ferrer, V González, R. Muñoz, JV Mesías, A Montoliu (Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la Sida de Catalunya (CEEISCAT, Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), E Martró, V Saludes, S González-Gómez, A Antuori (Laboratorio Clínico Metropolitana Norte, Hospital Universitario e Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol), L Alemany, MA Pavón, S Paytubi, A Esteban, M Vergara, V Rodriguez (Programa de Recerca d'Epidemiologia del Càncer (PREC), Institut Català d'Oncologia (ICO)), K Santander, L Villegas, M Villar, H Adell (STOP SIDA), M Meroño, M Cebrián, C Carrascal (Fundació Àmbit Prevenció), E Longares (Gaispositius) L. Martínez (Metges del Món) R Almirall (Servei Trànsit) R Mansilla (Agència de Salut Pública de Catalunya), S de Sanjosé (PREC, ICO)

Antecedentes/Objetivos

Las **mujeres trans (TTS) y hombres cis (HTS) que ejercen el trabajo sexual (TS)** son poblaciones


- **vulnerables** a la infección por VIH/ITS.
- expuestas a **condiciones sindémicas**
- **Ocultas** en los sistemas de vigilancia epidemiológica y servicios
- Su salud sexual y los factores conductuales, sociales y estructurales que les afectan han sido **poco investigados**.

Objetivo: Estimar prevalencia de VIH e ITS bacterianas y víricas y describir factores socio-demográficos, conductuales y psicosociales en TTS y HTS en la visita basal de SexCohort

Metodología


- **Estudio longitudinal/investigación comunitaria** en mujeres trans y hombres cis trabajadores sexuales que acuden a las entidades STOP SIDA y Àmbit Prevenció en Barcelona.
- **Criterios de inclusión:** mayoría de edad, haber ejercido el trabajo sexual en los últimos 3 meses y firmar consentimiento informado.
- **Tamaño de la muestra** 300 participantes.
- **Seguimiento** 2 años (visita cada 6 meses)
- **Periodo basal:** mayo 2019- julio 2020
- **Recogida de datos** bio-conductual y social
 - **Cuestionario** auto-cumplimentado mediante tableta
 - **Muestra** biológica anatómica, orina y sangre (VPH, VHC, VHB, Sífilis, CT, NG, VIH)

- Procedimientos:**




Resultados. Perfil sociodemográfico

Total participantes en la 1ª ola SexCohort (mayo 2019-julio 2020): **273**




Nivel educativo.



Permiso de residencia

■ Sí ■ No ■ en tràmite



18,3% tuvieron ingresos de otro trabajo diferente del sexual (último mes)


45% cobran < 1000€

Resultados. Trabajo sexual




El 29,4% han viajado a otros países para ejercer el trabajo sexual (últimos 6 meses)

Espacio donde ejerce el trabajo sexual




Media de 7 clientes/semana

Uso del condón en la penetración anal con el cliente



Resultados. Consumo de sustancias y prisión



Alguna vez en la vida



(Drogas) 7,8%




(hormones) 76%

Prisión: 12,9 %

Resultados. Acceso al sistema sociosanitario

No tienen tarjeta sanitaria/seguro médico y no la están tramitando: 12,9 %



Prueba VIH anterior: 97 %

Evitar acceso por miedo al estigma VIH: 10 %


Transición o cirugía de cambio de sexo: 65% 

Resultados. Experiencias de violencia y soporte



Agresión física o abuso sexual último año: 24,4 %
Cliente: 9,2%

Experiencias de discriminación



10% no se siente apoyado


57,9% padres o hermanos;

31,4% pareja o amigos




Resultados. Prevalencia VIH e ITS

Prevalencia VIH/ITS en visita basal (N=273)




Prevalencia de ITS localizada en boca/faringe según determinantes sociales

Disponer de tarjeta sanitaria




Agresión física o abuso sexual ejercido por el cliente




p<0,05

Prevalencia de ITS localizada en ANO según determinantes sociales

Discriminación en la calle




Consumo intensivo de drogas




p<0,05

Prevalencia de VIH según determinantes sociales


Nivel educativo



Discriminación durante la búsqueda de trabajo



Discriminación en un centro sanitario



Conclusiones

- TS son poblaciones presentan múltiples **factores de vulnerabilidad** al VIH/ITS
 - 1 de cada 4 presentan un nivel educativo bajo y casi la mitad perciben bajos ingresos
 - 1 de cada 3 ejerce en la calle, especialmente las mujeres trans.
 - Frecuentes experiencias de discriminación y violencia sobre todo en el trabajo, escuela, buscando vivienda y en la calle y en particular por razón de género
 - Elevado consumo de drogas con los clientes y ~ de la mitad de hombres policonsumen.
- Las **altas prevalencias de VIH e ITS** en distintas localizaciones, demuestran la necesidad de diseñar programas específicos de cribado de TS, priorizando la recogida anal.
- La relación de determinantes sociales con una mayor prevalencia de ITS/VIH requiere de estrategias preventivas **holísticas**
- Rol central de los **centros comunitarios** en el acceso a esta población.

Agradecimientos

A las mujeres trans y hombres que han participado en el proyecto y al equipo del Centro de Atención Primaria Manso y la Unidad de ITS de Drassanes que participan en el circuito de derivaciones y a todo el equipo Sexcohort



Contacte: lferrer@ceeiscat.cat